

## 生後1歳半までの予防接種スケジュールプラン例…



BCGは集団接種であることが多く、予定の変更が困難。BCGの予定にあわせてHib、肺炎球菌、DPTの日程を組むのがよい。プラン例は接種順に記載している。母子健康手帳に貼って予防接種を受けたかどうかの確認にご使用ください。

### Plan C B型肝炎、ロタウイルスワクチンの接種を行わず、それ以外の予防接種を最短で終了させたい場合

ワクチンの種類	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月	10ヵ月	11ヵ月	12ヵ月	13ヵ月	14ヵ月	15ヵ月	16ヵ月	17ヵ月
Hib		◎	◎		◎									◎			
肺炎球菌		◎	◎		◎									◎			
B型肝炎*1																	
ロタ*2																	
DPT			◎	◎	◎									◎			
ポリオ(不活化)*4			◎	◎	◎									◎			
BCG*3				○													
MR*3												◎					
水痘*3													◎				
ムンプス															◎		

注) ◎は、同時接種を示している。

ワクチンの種別：      予防接種法、定期一類疾病予防接種      ワクチン接種緊急促進対策事業の対象      任意接種

- \*1 B型肝炎は集団生活を始める前には3回接種しておくことが望ましい。
- \*2 ロタウイルスに対するワクチンは生後6週～24週までに2回、経口で与える。ここではロタリックス®のスケジュールを示している。ロタテック®の場合は3回接種が必要である。
- \*3 生ワクチンのため、接種後、27日間あけて次の予防接種を行うこと。
- \*4 ポリオ(不活化)は4種混合となった場合はDPTと一緒に接種する。

作成：昭和大学医学部小児科 水野克己(母乳 育児 感染 — 赤ちゃんとお母さんのために— 南山堂刊 付録©)