

『母乳とくすり』 訂正表

いつも小社出版物をご利用いただき誠にありがとうございます。

『母乳とくすり』について以下の誤りがございました。深くお詫びするとともに、ここに訂正致します。

● p 79 表 3-2

薬剤名（一般名）	商品名	報告されている児への影響
アセブトロール	アセタノール [®] ， セクトラール [®]	低血圧，徐脈，多呼吸
アテノロール	テノーミン [®] など	チアノーゼ，徐脈
ブロモクリプチン	パーロデル [®] ， アップノール B [®] など	乳汁分泌抑制， 母体に有害の可能性あり
アスピリン （サリチル酸）	アスピリン [®]	代謝性アシドーシス （1例のみ報告）
クレマスチン	テルギン G [®] ， タベジール [®]	傾眠，易刺激性，哺乳不良， 甲高い泣き声，項部硬直（1例）
エルゴタミン	カフェルゴット [®] ，ヘクト [®]	嘔吐，下痢，痙攣
リチウム	リーマス [®] ， リチオマール [®]	治療血中濃度の 1/3～1/2 が 児に移行
フェノバルビタール	フェノバル [®] ， ワコビタール [®] など	鎮静，離脱時の痙攣， メトヘモグロビン血症（1例）
プリミドン	マイソリン [®] ，プリムロン [®]	鎮静，哺乳障害
スルファサラジン	サラゾピリン [®] ， アザルフィジン [®] など	血性下痢（1例）

●97ページ コラム内

【誤】メキタジン（セルテクト），オキサトミド（ニボラジン）

【正】メキタジン（ニボラジン），オキサトミド（セルテクト）

2011年1月現在