

『開業医の外来小児科学』（改訂6版） 訂正表

いつも小社出版物をご利用いただき、誠にありがとうございます。
『開業医の外来小児科学』（改訂6版）に、以下の誤りがございました。
著者の皆様、読者の皆様に深くお詫びするとともに、ここに訂正致します。

- p. 415 の中ほど、「b. ザナミビル水和物ドライパウダーインヘラー（リレンザ®）」の箇所、3行目

誤り

b) ザナミビル水和物ドライパウダーインヘラー（リレンザ®）

A 型、B 型の両方に効果があり、副作用も少なく、耐性株の出現も少ない。効果もよく早期に症状が消失するので、優れた薬剤である。しかし吸入療法のため小学生以下の小児には使用し難く、内服薬ほど使用されていない。成人および小児にはザナミビルとして1回 10 mg（5 mg プリスターを2プリスター）を1日1回、10日間専用の吸入器を用いて吸入する。

訂正

b) ザナミビル水和物ドライパウダーインヘラー（リレンザ®）

A 型、B 型の両方に効果があり、副作用も少なく、耐性株の出現も少ない。効果もよく早期に症状が消失するので、優れた薬剤である。しかし吸入療法のため小学生以下の小児には使用し難く、内服薬ほど使用されていない。成人および小児にはザナミビルとして1回 10 mg（5 mg プリスターを2プリスター）を1日2回、5日間専用の吸入器を用いて吸入する。予防の場合は、成人および小児にはザナミビルとして1回 10 mg（5 mg プリスターを2プリスター）を1日1回、10日間専用の吸入器を用いて吸入する。

2013/06/27 現在

『開業医の外来小児科学』（改訂6版） 訂正表

いつも小社出版物をご利用いただき、誠にありがとうございます。

『開業医の外来小児科学』（改訂6版）に、以下の誤りがございました。

著者の皆様、読者の皆様に深くお詫びするとともに、ここに訂正致します。

- p.699の上、「図V-K-9 CHにおける障害部位別ホルモン動態」の箇所

