

『小児の薬の選び方・使い方』（5版2刷） 正誤表

いつも小社出版物をご利用いただき誠にありがとうございます。

当該書籍に以下の誤りがございました。深くお詫びするとともにここに訂正いたします。

■p.83 「けいれん」のフローチャート

【誤】

ミダゾラム注射液 鼻腔・頬粘膜・筋注投与
0.3mg/kg（最大10mg/kg）

【正】

ミダゾラム注射液 鼻腔・頬粘膜・筋注投与
0.3mg/kg（最大10mg/回）

■p.316 「急性中耳炎」の処方例

【誤】ワイドシリソ[®]細粒 20% 60～90g/kg/日

【正】ワイドシリソ[®]細粒 20% 0.3～0.45g/kg/日

■p.386, 387 「起立性調節障害」の処方例

処方例1

【誤】メトリジン[®]錠2mgまたはメトリジン[®]D錠2mg 4mg/kg/日

【正】メトリジン[®]錠2mgまたはメトリジン[®]D錠2mg 4mg/日

処方例2

【誤】メトリジン[®]錠2mgまたはメトリジン[®]D錠2mg 6mg/kg/日

【正】メトリジン[®]錠2mgまたはメトリジン[®]D錠2mg 6mg/日

処方例4

【誤】メトリジン[®]錠2mgまたはメトリジン[®]D錠2mg 4～6mg/kg/日

【正】メトリジン[®]錠2mgまたはメトリジン[®]D錠2mg 4～6mg/日

2025年5月現在