

『小児の薬の選び方・使い方』（5版2刷） 正誤表

いつも小社出版物をご利用いただき誠にありがとうございます。

当該書籍に以下の誤りがございました。深くお詫びするとともにここに訂正いたします。

■p.83 「けいれん」のフローチャート

【誤】

ミダゾラム注射液 鼻腔・頬粘膜・筋注投与
0.3mg/kg (最大10mg/kg)

【正】

ミダゾラム注射液 鼻腔・頬粘膜・筋注投与
0.3mg/kg (最大10mg/回)

■p.267 「気管支喘息」の処方例

②ステロイド薬の経口投与
20kg の児

【誤】 プレドニン[®]錠 5mg 1mg/kg/日
(プレドニゾロンとして 20mg/kg/日)

【正】 プレドニン[®]錠 5mg 1～2mg/kg/日
(プレドニゾロンとして 1～2mg/kg/日)

■p.316 「急性中耳炎」の処方例

【誤】 ウィドシリソ[®]細粒 20% 60～90g/kg/日

【正】 ウィドシリソ[®]細粒 20% 0.3～0.45g/kg/日

■p.386, 387 「起立性調節障害」の処方例

処方例1

【誤】 メトリジン[®]錠2mgまたはメトリジン[®]D錠2mg 4mg/kg/日

【正】メトトリジン®錠2mgまたはメトトリジン®D錠2mg 4mg/日

処方例2

【誤】メトトリジン®錠2mgまたはメトトリジン®D錠2mg 6mg/kg/日

【正】メトトリジン®錠2mgまたはメトトリジン®D錠2mg 6mg/日

処方例4

【誤】メトトリジン®錠2mgまたはメトトリジン®D錠2mg 4~6mg/kg/日

【正】メトトリジン®錠2mgまたはメトトリジン®D錠2mg 4~6mg/日

2025年9月現在